

マルメロ、カリン（果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる）

マルメロ

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期（回数）	使用回数	赤星病	ごま色斑点病	黒点病	腐らん病	ゆかび斑点病	ゆかび促進	アブラムシ類	シンクイムシ類
I Cボルドー412FL	無機	M1		-	-		◎						
スコア顆水	DMI	3		7	3		◎						
トリフミン水	DMI	3		14	3	◎							
トップジンM水	ベンゾイミダゾール	1		1	6				◎				
トップジンMペースト	ベンゾイミダゾール	1		*c	3					◎			
オキシンドー水80	有機銅	M1		14	4			◎					
キノンドー水80	有機銅	M1		14	4		◎	◎					
オーソサイド水80	他	M4		14	6			◎					
ダコニール1000FL	他	M5		30	4		◎						
ベフラン液25	他	M7	劇	*a	*b				◎				
アディオンFL	ピレスロイド	3A		14	2								◎
サイアノックス水	有機リン	1B		45	2							◎	◎

*a:展葉期 *b: 4回以内（但し開花期以降散布は3回以内）

*c:剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後

カリン

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期（回数）	使用回数	赤星病	ごま色斑点病	黒点病	腐らん病	白かび斑点病	ゆかび促進	シンクイムシ類	ナシヒメシンクイ
トリフミン水	DMI	3		1	3	◎							
トップジンM水	ベンゾイミダゾール	1		1	6				◎				
トップジンMペースト	ベンゾイミダゾール	1		*c	3						◎		
オキシンドー水80	有機銅	M1		14	4			◎					
キノンドー水80	有機銅	M1		14	4		◎	◎					
ダコニール1000FL	他	M5		45	3		◎	◎		◎			
ベフラン液25	他	M7	劇	*a	*b				◎				
モスピラン顆溶	ネオニコチノイド	4A	劇	14	2								◎
アディオン水	ピレスロイド	3A		3	3							◎	◎

*a:展葉期 *b: 4回以内（但し開花期以降散布は3回以内）

*c:剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後

マルメロ・カリン