

オリーブ (果樹類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用 機 構 分 類 コ ー ド	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	炭 疽 病	梢 枯 病	ゆ 合 促 進	カ イ ガ ラ ム シ 類	カ メ ム シ 類	マ エ ア カ ス カ シ ノ メ イ ガ	ハ マ キ ム シ 類	オ リ ー ブ ア ナ ア キ ゾ ウ ム シ
I Cボルドー66DFL	無機	M1		—	—	◎							
クプロシールドFL	無機	M1		—	—	◎							
アミスター10FL	Q o I	11		30	2	◎							
トップジンM水	ベンゾイミダゾール	1		30	2		◎						
トップジンMペースト	ベンゾイミダゾール	1		*b	3			◎					
ペンコゼブ水	有機硫黄	M3		90	2	◎							
セイビアーFL20	他	12		7	2	◎							
パイオセーフ	天敵生物	—		*a	—								幼
モベントFL	殺ダニ	23		7	2			◎					
アルバリン溶 スタークル溶	ネコチノイト ^o	4A		1	2				◎				
ダントツ溶	ネコチノイト ^o	4A		1	2				◎	◎			◎
ベニカ溶	ネコチノイト ^o	4A		1	2				◎	◎			◎
モスピラン顆溶	ネコチノイト	4A		7	1				◎				
アディオオン水	ヒレスロイト ^o	3A		7	2				◎			◎	◎
スミチオン乳	有機リン	1B		21	3								◎

*a: 幼虫発生期 *b: 剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後

幼: 幼虫

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
炭疽病	生育期	1. 雨よけ栽培を行う。 2. 発生を見たら、初期に次の薬剤のいずれかを散布する。 アミスター10フロアブル 1000倍 ペンコゼブ水和剤 600倍	
オリーブアナアキゾウムシ		・ 成虫は夜行性で、地際部の樹皮下に産卵することが多いので、成虫の捕殺や、地際部に紙を巻くなどして産卵を防止する。	幼虫がイボタ、ネズミモチ、オリーブの材部を食害する。 成虫は春から秋まで活動する。