

グラジオラス (花き類・観葉植物の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	球根腐敗病	赤斑病	ボトリチス病	アザミウマ類	アブラムシ類
ポリオキシシナール	抗生物質	19		*d	8		◎	◎		
ホームイコート水	有機硫黄・ベンゾイミダゾール	M3・1		*c	1	◎				
ホームイ水	有機硫黄・ベンゾイミダゾール	M3・1		*c	1	◎				
スカウトFL	ピレスロイド	3A	劇	-	5				◎	◎
オルトラン水	有機リン	1B		*b	1				◎	

*b: 植付時

*c: 植付前又は貯蔵前

*d: 発病初期

グラジオラス(花き類・観葉植物の登録農薬も使用できる)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
赤斑病・ボトリチス病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ポリオキシシンAL水溶剤 2500倍	
球根腐敗病	貯蔵前・植付前	1. 貯蔵の際は乾燥を保つように心がける。 2. 次の薬剤のいずれかを球根処理する。 ホーマイコート(水) 粉衣：球根重量の2～3% ホーマイ水和剤 粉衣：球根重量の1.0% 浸漬：200倍液に30分 3. 次の薬剤いずれかで土壌消毒する。 ガスタード微粒剤* バスアミド微粒剤* いずれも20～30kg/10a	貯蔵中に多湿であると発生しやすい。 *花き類・観葉植物での登録
モザイク病	生育期	1. 発病株は掘り取って圃場の外で処分する。 2. アブラムシ類を防除する。	CMV、BYMVによるものがある。 いずれもアブラムシ類によって媒介される。
アザミウマ類	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 スカウトフロアブル 2000倍	
ネコブセンチュウ	植付前	1. 発生地では土壌消毒をする(土壌消毒の項参照)。 2. 寄生が認められた球根や木子は次の方法で温湯浸漬する。 ①予浸30°Cの温湯に30分浸漬 ②本浸49°Cの温湯に 大球は25～29分、 小球や木子は20～22分浸漬	サツマイモネコブセンチュウとキタネコブセンチュウが寄生する。
その他の病害虫		首腐病、青かび病、角斑病、葉枯病、乾腐病、菌核病、ハダニ類	