

プリムラ (花き類・観葉植物の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用 機 構 分 類 コ ー ド	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	灰 色 か び 病	う ど ん こ 病	ア ブ ラ ム シ 類	オン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ	キン ケ ク チ ブ ト ゾ ウ ム シ	ハ ダ ニ 類	ナ メ ク ジ 類
トップジンMゾル	ベンゾイミダゾール	1		*d	5	◎						
サンヨール乳	有機銅	M1		*c	8	◎	◎	◎			◎	
サンヨール液AL	有機銅	M1		*c	8		◎	◎			◎	◎
ガゼット粒	カーバート	1A	劇	*a	1					成・ 幼		
スプラサイド乳40	有機リン	1B	劇	*b	6				◎	成		

*a:生育期 *b:発生初期 *c:開花前まで *d:発病初期
成:成虫 幼:幼虫

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
灰色かび病	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 フルピカフロアブル* 2000～3000倍 ポリベリン水和剤△* 1000倍	マラコイデス、オブコニカに発生が多い。 △花弁に葉害を生じることがある。 *花き類・観葉植物での登録
オンシツコナジラミ	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 スプラサイド乳剤40 1000倍 ベストガード水溶剤* 1000倍	*花き類・観葉植物(コナジラミ類)での登録
アブラムシ類		・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アドマイヤーフロアブル* 2000倍 オルトラン水和剤* 1000～1500倍 ロディー乳剤* 1000倍	*花き類・観葉植物での登録
その他の病害虫		モザイク病、軟腐病、斑点病、苗木枯病	