

ポインセチア (樹木類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	うどんこ病	アブラムシ	コナジラミ	オンシツコナジラミ	※タバココナジラミ	チビクロバネキノコバエ	シヤクトリムシ	ケムシ	オビカレハ
モレスタン水	他	M10/UN		*d	10	◎								
				*a			◎	○	○					
エンストリップ	天敵生物	-		*a	-		施	施	施					
アブロード水	I G R	16		*a	6			幼	幼					
ノーモルト乳	I G R	15		*a	2		◎	○	○					
サンマイトFL	殺ダニ	21A	劇	-	2		◎	○	○					
アドマイヤーFL	ネコチノイト [®]	4A	劇	*a	5		施	施	施	施				
アドマイヤー1粒	ネコチノイト [®]	4A		*c	5		◎	◎	○	○				
ベストガード溶	ネコチノイト [®]	4A		*a	4		◎	◎	○	○	◎			
トレボン乳	ヒ [®] レス [®] ト [®]	3A		-	6			◎	○	○				
				*b								◎	◎	◎
アブロードエースFL	殺ダニ・IGR	21A・16		*a	6			◎	○	○				

*a: 発生初期
 *b: 幼虫発生期
 *c: 生育期
 *d: 発病初期

施: 施設栽培
 幼: 幼虫

※: タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)

ポインセチア（樹木類の登録農薬も使用できる）

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
根腐病・立枯病	生育期	・灌水過多にならないように注意する。	根腐病はピシウム菌により、9～12月にかけて発生する。 立枯病はリゾクトニア菌による。
灰色かび病	生育期	・施設内の過湿に留意し、発病株はただちに処分する。	
うどんこ病	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 モレスタン水和剤△ 2000倍	△品種によっては苞葉に薬害を生じるおそれがあるので苞葉着色後は使用しない。
タバココナジラミ（オンシツコナジラミも防除法は同じ）	生育期	・発生初期に次の薬剤のいずれかを散布する。 アプロードエースフロアブル# 1000倍 サンマイトフロアブル# 1000倍 ベストガード水溶剤# 1000倍	#コナジラミ類での登録