

植木・樹木類の病害虫

樹木類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒毒性	使用時期(回数)	炭疽病	立枯病	くもの巣病	白絹病	斑点病	うどんこ病	灰色かび病	ごま色斑点病	輪紋葉枯病	枝枯細菌病	萎凋病	ゆめ進
I Cボルドー66DFL	M1		-					◎							
Zボルドー水	M1	*a	-					◎			◎				
ドイツボルドーA水	M1	*a	-					◎							
タチガレン液	32	*d	1		林										
トップジンM水	1	*a	5	ツ				ツ	ツ		ツ	ツ			
トップジンMペースト	1	*b	5												◎
ペンレート水	1	*a	-	◎							◎	◎			
ピリカット乳	39	*a	6					◎							
バシタック水75	7	*a	3			◎	◎								
モンカットFL40	7	*a	3			◎	◎								
フルピカFL	9	*a	5						カ	カ					
マイコシールド水	41	*e	5										◎		
リゾレックス水	14	*a	5			◎	◎								
アンピルFL	3	*a	7	ヤ											
トリフミン水	3	*a	5					◎							
パッチコロン水	3	*g	5					◎							
マネージ乳	3	*a	6						マ						
微量注入用ウッドキングDASH乳	3	-	-												ナ
バリダシン液	U18	-	3		林										
サンヨール乳	M1	*h	8						シ						
チウラム80水	M3	*c	-		針										
ペンコゼブ水	M3	*a	4	◎			◎								
		*e										◎			
ベルコート水	M7	*a	3	◎											
モレストタン水	M10	*a	10						コ						
バクテサイド水	25・41・M1	*e	5										◎		
グッター水	1・10	*f	5							ハ					
ショウチノスケFL	9・U13	*g	2					◎							
ポリベリン水	19・M7	*a	3						サ	サ					

*a:発病初期 *b:剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後 *c:播種前
 *d:播種覆土直後 *e:新梢伸長期～発病初期 *f:感染期～発生初期
 *g:発病前～発病初期 *h:発生初期 針:針葉樹 林:林木(苗木)
 カ:カシを除く コ:コデマリ、ポインセチア、ヤナギを除く
 サ:カシ、マサキ、サルスベリを除く シ:ツツジ類を除く
 ツ:ツツジ類、カシ、サクラ、ジンチョウゲ、ボケ、ポプラ、イヌツゲを除く
 ナ:ナラ類を除く ハ:ハイドラング、ヤナギを除く
 マ:マサキ、サルスベリ、ジンチョウゲ、ポプラ、ボケ、ヤナギ、セイヨウキンシバイを除く
 ヤ:ヤナギ、ボケ、セイヨウキンシバイを除く

樹木類

樹木類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	適用回数	アブラムシ	カイガラムシ	グンバイムシ	スギザイノタマバエ	シヤクトリムシ	エダシヤク	ケムシ	オビカレ	ドクガ	マメイカシロヒトリ	イライムシ	カミキリムシ	コガネムシ	ゾウムシ	ハダニ	ネグサレセンチュウ	その他害虫		
エスマルクDF	11A		*a	-						◎	◎	◎	◎	◎	◎									
ザブリナFL	11A		*a	-							◎	◎	◎	◎	◎									
ゼンターリ顆水	11A		*a	-							◎	◎	◎	◎	◎									
トアロー水CT	11A		*a	-	つ										◎	◎								
バイオマックスDF	11A		*a	-						◎	◎	◎	◎	◎	◎									
バシレックス水	11A		*a	-							ト													
ラビサンスプレー	UNM		*k	-			◎																	
アタックオイル	UNM		-	-			◎																	
ニトルアー <アメシロ>	-		*b	-											◎									
オンコル粒5	1A		*s	3	じ	◎																		
オルトラン粒	1B		*t	5	ポ						◎													
オルトラン液	1B		*a	5	ら														幼					
オルトランカプセル	1B		*p	2	あ						◎	◎	◎	◎	◎									
オルトラン水	1B		*a	5																		ア		
カルホス乳	1B	劇	*a	6	ま	◎					◎	◎	◎	◎	◎							オ		
スミチオン乳	1B		*f	1											◎							オ		
			-	6		◎	◎												フ					
スミパイン乳*1	1B		*g									ヤ												
			*d							◎														
			*c					◎										◎	◎		◎			
			*h			6																	ヒ	
			*i																					
			*j				倒																	
			*Q																					
			*f	1																		オ		
ダイアジノンSLゾル	1B		*o	1																幼				
ダイアジノン水34	1B	劇	*a	4											◎									
ネマバスター液	1B	劇	*f	1																		イ		
アデオン乳	3A		*a	6	く	◎				◎	◎	◎	◎	◎	◎									
トレボンEW	3A		*a	6	い						◎	◎	◎	◎	◎									
トレボン乳	3A		*e	6	そ					◎	◎	◎	◎	◎	◎									
ロビンフッド エアゾル	3A		-	6		◎						◎	◎	◎	◎			◎						
アドマイヤー1粒	4A		*n	2	じ															◎				
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		*a	5	ツ							◎	◎	◎	◎									
マツグリーン液2	4A		*a	5	と	◎	◎						◎	◎	◎	◎								
			*m	1	ブ																			
モスピラン顆溶	4A	劇	*a	5	マ			◎																
ディアナSC	5		*a	2																		ハ		
アグリメック乳	6	劇	*f	1	し																	浸		
リバイブ液	6		*r	1	で								樹	樹	樹	樹	樹							

樹木類(作物群登録)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (日数)	使用 回数	適 用 目 数	ア ブ ラ ム シ 類	カ イ ガ ラ イ ム シ 類	グ ン バ イ ノ タ マ バ エ 類	ス ギ ザ イ ノ タ マ バ エ 類	シ ヤ ク ト リ ム シ 類	エ ダ シ ヤ ク 類	ケ ム シ 類	オ ビ カ レ ハ 類	ド ク ガ イ ガ 類	マ イ マ シ ロ ヒ ト リ ガ 類	イ ラ ガ 類	キ ク イ ム シ 類	カ ミ キ リ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類	ゾ ウ ム シ 類	ハ ダ ニ 類	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 虫	そ の 他 害 虫
バロックFL	10B		*a	1																		◎	
バダンSG溶	14	劇	*a	3					◎	○													
アタブロンSC	15		*a	4							◎	○	○	○	○								
デミリン水	15		-	3								若	若	若	若	若							
アブロードFL	16		-	6		幼																	
マトリックFL	18		*a	5							◎	○	○	○	○								
ロムダンFL	18		*a	5							◎	○	○	○	○								
トルネードエースDF	22A		*a	4	さ						◎	○	○	○	○								
ファイントリムDF	22A		*a	4	さ						◎												
アクセルFL	22B		*a	6	さ						◎	○	○	○	○								
アセルプリンFL	28		*L	2							◎	○	○	○	○								
スティンガーFL	28		*a	2							◎	○	○	○	○								
ヨーバルFL	28		*a	3							◎	○	○	○	○								
ロックオン水	28		*a	2	ぬ						◎	○	○	○	○								
サンヨール乳	-		*a	8	じ	◎																	
サンヨール液AL	-		-	8	る						◎	○	○	○	○	◎							

*1:空中散布方法による適用害虫については本表には記載していない。

- *a:発生初期 *b:成虫発生初期から発生後期 *c:成虫発生初期又は直前
 *d:若齢・中齢幼虫期 *e:幼虫発生期 *f:移植前 *g:幼虫期
 *h:成虫の発生直前～発生最盛期直前(6～7月) *i:虫えい形成期
 *j:伐倒、風倒直後樹皮下及び材内生息期 *k:夏期 *L:発生前～発生初期
 *m:春季～秋季 *n:植付時 *o:鉢上げ時又は鉢代え時 *p:発生期直前
 *q:樹皮下及び材内生息期 *r:発生前～発生期 *s:生育期 *t:生育期(樹高2m以下)
- ア:アザミウマ類 イ:イヌツグを除く オ:オオハリセンチュウ タ:スギタマバエ
 ツ:ツツジ類、ツバキ類を除く ト:トビモンオオエダシヤク ハ:ハマキムシ類
 ヒ:ヒノキカワモグリガ フ:フラーバラゾウムシ プ:サクラ、プラタナスを除く
 ボ:ツツジ類、ポインセチアを除く マ:マツ、ヤナギ、サクラを除く ヤ:ヤマダカレハ
 あ:アカギ、アカマツ、クロマツ、プラタナスを除く い:イヌマキ、ツツジ類を除く
 く:クチナシを除く さ:サクラを除く し:シキミを除く じ:ツツジ類を除く
 そ:ツツジ類、ポインセチア、ソテツを除く
 つ:ツバキ類を除く で:サクラ、デイゴ、ホウオウボクを除く
 と:ツツジ類、トチノキ、プラタナス、サンゴジュ、ヒイラギモクセイ、イヌマキ、アジサイ
 を除く
 ぬ:イヌマキ、サクラを除く ま:マサキ、モッコク、サクラを除く
 ら:サクラ、ツツジ類、ツバキ類、クチナシ、マサキ、サンゴジュを除く
 る:サルスベリ、マサキ、サザンカ、ツツジ類を除く
 若:若～中齢幼虫 樹:樹幹注入 浸:根部浸漬 倒:倒木、伐倒木
 幼:幼虫 成:成虫