

## 野菜類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	べと病	灰色かび病	さび病	白さび病	うどんこ病	黒腐病	軟腐病	褐斑細菌病	斑点細菌病	黒斑細菌病
クプロシールドFL	M1	-	-	◎							◎		◎	
コサイド3000DF	M1	-	-							◎	◎	◎	◎	
ドイツボルドーA水	M1	-	-	◎							◎			
I Cボルドー66DFL	M1	-	-								◎			
Zボルドー水	M1	-	-	キ						キ	キ	キ	キ	キ
イオウFL	M2		*a	-					ス					
硫黄粉剤50	M2	-	-						◎					
クムラス顆水	M2	-	-						◎					
カリグリーン溶	NC		1	-		ト	ト		ト					
サフオイル乳	NC		1	-					イ					
ハーモメイト溶	NC		1	-		◎	◎		◎					
アグロケア水	BM2		1	-		ミ			ミ					
インプレッションクリア水	BM2		*a	-		◎			◎					
エコショット顆水	BM2		1	-		◎								
タフパールFL	BM2		*a	-					◎					
バチスター水	BM2		*a	-		ト			ト					
ポトキラー水	BM2		*a	-		◎			◎					
ポトピカ水	BM2		*a	-		◎								
サンクリスタル乳	-		1	-					マ					
バイオキパー水	-		*a	-							カ			
ポタニガードES乳	-		*a	-					◎					
マスタピース水	-		1	-							ハ			
クリーンカップ水	M1・BM2		1	-		◎			◎					
ジーファイン水	NC・M1		1	-				ナ	ナ		ナ			
アカリタッチ乳	-		1	-					◎					
エコピタ液	-		1	-							チ			
フーモン乳	-		1	-					◎					

\*a:発病前～発病初期

イ:イチゴ、トマト、ミニトマトを除く カ:カボチャ、ズッキーニを除く キ:キャベツを除く

ス:スイカ、カボチャ、トマト、ミニトマト、ネギ、ワケギ、アサツキ、イチゴを除く

チ:イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く ト:トマト、ミニトマトを除く

ナ:ナスを除く ハ:ダイコン、ハクサイ、ブロッコリー、キャベツ、レタス、非結球レタス、カボチャ、ズッキーニ、ショウガ、トマト、ミニトマトを除く

マ:ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く

ミ:トマト、ミニトマト、ピーマン、ホウレンソウ、食用ユリ、食用ギク、キク(葉)、セルリー、ナス、ニラ、パセリ、シソを除く

野菜類 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	使用回数	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナガ	ハイマダラノメイガ	ウリノメイガ	アオムシ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	オオタバコガ	ウワバ	ナメクジ	ハマダニ	ホコリダニ	センチュウ
エコマスターBT	11A		*a	-						◎		◎	◎	◎		◎						
エスマルクDF	11A		*a	-						◎		◎	◎			◎						
サブリナFL	11A		*a	-	え					◎		◎	◎	◎		◎						
ジャックポット顆水	11A		*a	-	は					◎		◎			◎	◎						
ゼンターリ顆水	11A		*a	-	は					◎		◎	◎	◎	◎	◎						
チューレックス顆水	11A		*a	-	は					◎		◎			◎	◎						
チューンアップ顆水	11A		*a	-						◎	◎	◎	◎		◎	◎						
デルフィン顆水	11A		*a	-						◎	◎	◎		◎	◎	◎						
トアローFLCT	11A		*a	-						◎		◎				◎						
トアロー水CT	11A		*a	-	ば					◎		◎										
バシレックス水	11A		*a	-						◎		◎	◎	◎				マ				
フローバックDF	11A		*a	-						◎		◎	◎	◎		◎						
クムラス顆水	UN		-	-																	◎	
アフィパール	-		*b	-	施	◎																
アリガタ	-		*b	-	施			◎														
エルカード	-		*b	-	施		◎															
エンストリップ	-		*b	-	施		◎															
オリストアーA	-		*b	-	施			◎														
カゲタロウ	-		*b	-	施	◎																
ククメリス	-		*b	-	施			◎														
クプロシールドFL	-		*k	-	施																◎	
ゴッツA乳	-		*b	-	施	◎	◎															
コレトップ	-		*b	-	施	◎																
コレバラリ	-		*b	-	施	◎																
コンフェューザーV	-		*f	-					◎				ガ	◎	◎	◎	ウ					
サバクトップ	-		*b	-	施		◎															
サフオイル乳	-		1	-	ご	◎	◎														◎	チ
サンクリスタル乳	-		1	-	な	◎	◎														◎	
スパイカルEX	-		*b	-																	◎	
スパイカルプラス	-		*b	-																	◎	
スパイデックス	-		*b	-	施																◎	
スワルスキー	-		*h	-	施		◎	◎														チ
スワルバンカー	-		*h	-	施		◎	◎														ホチ
スワルスキープラス	-		*h	-	施		◎	◎														ホチ
タイリク	-		*b	-	施			◎														
チリガブリ	-		*b	-	施																◎	
チリカ・ワーカー	-		*b	-	施																◎	
チリトップ	-		*b	-	施																◎	
チャバラ	-		*b	-	施	◎																
ツヤコパチEF30	-		*b	-	施		◎														◎	
ツヤトップ	-		*b	-	施			オ														
ツヤトップ25	-		*b	-	施			オ														
ツヤバラリ	-		*b	-	施	◎																
トスパック	-		*b	-	施				◎													
ナミトップ	-		*b	-	施	◎																

野菜類

# 野菜類 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	使用回数	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナガ	ハイマダラノメイガ	ウリノメイガ	アオムシ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	オオタバコガ	ウワバ	ナメクジ	ハダニ	センチュウ	ホコリダニ	ネ
ナミトップ20	-		*b	-	施	◎																	
バイオセーフ	-		*g	-										◎									
バストリア水	-		*c	-																			ネ
ヒメトップ	-		*b	-	施					◎													
ブリファード水	-		*b	-	施	フ	い																
ポタニガード水	-		*b	-	施	◎	◎	◎															
ポタニガードES乳	-		*b	-	施	◎	◎	◎		◎											◎		
マイコトール水	-		*b	-	施		◎																
マイネックス	-		*b	-	施				◎														
ミドリヒメ	-		*b	-	施				◎														
ミヤコトップ	-		*b	-	施																	◎	
ミヤコバンカー	-		*h	-	施																	◎	
メリトップ	-		*b	-	施				◎														
リクトップ	-		*b	-	施				◎														
リモニカ	-		*h	-	施		◎	◎															チ
ラノーテープ*1	7C		*i	1	施		◎																
アカリタッチ乳	-		1	-																		◎	
エコピタ液	-		1	-	と	と	と																と
オレート液	-		*d	-	い	い	い																
石灰窒素50	-		*e	1																			◎
フーモン乳	-		1	-		◎	◎															◎	
粘着くん液	-		1	-		◎	◎															◎	

\*1:ラノーテープの使用に当たっては地域の関係機関等と協議する必要がある。  
 \*a:発生初期(但し収穫前日まで) \*b:発生初期 \*c:定植前 \*d:発生初期～収穫前日まで  
 \*e:播種前または植付前 \*f:対象作物の栽培全期間 \*g:老齢幼虫発生期  
 \*h:発生直前～発生初期 \*i:栽培期間中 \*j:定植時 \*k:発生前～発生初期  
 い:イチゴを除く え:ハクサイ、エゴマ(葉)を除く  
 ご:イチゴ、トマト、ミニトマトを除く  
 と:イチゴ、トマト、ミニトマト、キュウリ、ナスを除く  
 な:ナス、トマト、ミニトマト、シュンギクを除く は:ハクサイを除く  
 ば:パセリ、エゴマ(葉)を除く ま:トマト、ミニトマトを除く  
 う:イラクサギンウワバ及びタマナギンウワバ オ:オンシツコナジラミ ガ:ヨトウガ  
 ち:チャノホコリダニ ネ:ネコブセンチュウ  
 ハ:ハダニ類及びチャノホコリダニ(但しイチゴ、トマト、ミニトマトを除く)  
 ホ:チャノホコリダニ(但しトマト、ミニトマトを除く) マ:タマナギンウワバ  
 ワ:ワタアブラムシ(但しイチゴを除く)  
 施:施設栽培(露地栽培には使用できない)  
 露:露地栽培(放飼後の厳冬期の月平均気温が10度を下回る地域)  
 ろ:露地栽培

野菜類