

ツツジ類*1 (作物群登録) (樹木類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	褐 斑 病	も ち 病	う ど ん こ 病	ア ブ ラ ム シ 類	カ イ ガ ラ ム シ 類	ロ ウ ム シ 類	ツ ツ ジ グ ン バ イ 類	ケ ム シ 類	シ ヤ ク ト リ ム シ 類	イ ラ ガ 類	コ ガ ネ ム シ 類	イ シ ユ ク セ ン チ ユ ウ	そ の 他 害 虫
Zボルドー水	M1		-	-		◎											
クプロシールドFL	M1		-	-	◎												
トップジンM水	1		*i	5	◎		◎										
バシタック水75	7		*i	8			◎										
ダコニール1000FL	M5		-	6	◎												
サンヨール乳	M1		*a	8			◎	◎			◎						ツ
チューリサイド水	11A		*a	-													ツ
オンコル粒5	1A		*d	1				◎								幼	
			*c	3												幼	
ガゼット粒	1A	劇	*c	1						◎							
			*f	2											◎		
オルトラン粒	1B		*a	5							◎						
			*m									◎					
オルトラン液	1B		*a	5						◎					幼		ベ
オルトラン水	1B		*a	5						◎							
ジェイエース溶	1B		*a	5						◎							
ジェイエース粒	1B		*a	5						◎							
スミチオン乳	1B		-	6							グ						ハ
ダイアジノンSLゾル	1B		*e	1												幼	
ネマトリンエース粒	1B		*g	1												◎	
アディオンFL	3A		-	6						◎							
スカウトFL	3A	劇	-	5						◎							
トレボン乳	3A		*h	6							◎	◎	◎				オ
			-								◎						
トレボンEW	3A		*a	6						◎	◎						
フォース粒	3A	劇	*e	1												幼	
アクタラ顆溶	4A		*a	5						◎							
アクタラ粒5	4A		*c	1						◎						幼	
			*e	1						◎						幼	
アドマイヤー1粒	4A		*k	2												◎	
			*a	5						◎							
アドマイヤーFL	4A	劇	*l	5						◎							
			*b	2						灌							
アルバリン顆溶	4A		*a	5						◎	◎						
スタークル顆溶	4A		*a	5						◎							
アルバリン粒	4A		*a	5						◎							
スタークル粒	4A		*a	5						◎							
ダントツ溶	4A		*a	6						◎							
マツグリーン液2	4A		*a	5				◎	◎			◎	◎				チ
モスピラン粒	4A		*a	1						◎							
トランスフォームFL	4C		*a	3						◎							
サンヨール液AL	-		-	8						◎	◎		◎				ツ
カダンKエアゾル	3A・ UNM・NC		*j	-					◎	◎							

*1: ツツジ類…アザレア、おおむらさき、くるめつつじ、さつき、しゃくなげ を含む

【どうだんつつじは含まない】

*a: 発生初期 *b: 発生前 *c: 生育期 *d: 定植時 *e: 植付時 *f: 定植時及び生育期 *g: 定植前

*h: 幼虫発生期 *i: 発病初期 *j: 夏期、冬期 *k: 植付又は植替時

*l: 発生初期 (但し露地栽培については発芽期から開花期を除く)、*m: 生育期 (樹高2m以下)

オ: オビカレハ グ: グンバイムシ類 チ: チュウレンジハバチ ツ: ツツジコナジラミ

ハ: ハマキムシ類 ベ: ベニモンアオリンガ 幼: 幼虫 灌: 株元灌注