

ウメ (果樹類、落葉果樹、小粒核果類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	か い よ う び 病	灰 色 か び 病	黒 星 病	灰 星 病	環 紋 葉 枯 病	す す 斑 病	う ど ん こ 病	縮 葉 病	白 紋 羽 病	枝 枯 病	ゆ 合 促 進
I C ボルドー66 DFL	M1		*a	-	◎										
Z ボルドー水	M1		*a	-	◎										
コサイド3000DF	M1		*f	-	◎										
イオウFL	M2		*g	-			◎								
クムラス顆水	M2		-	-			◎								
石灰硫黄合剤	M2		*d	-								◎			
ベンレート水	1		7	1			◎			◎					
ケンジャFL	7		1	3			◎								
アミスター10FL	11		1	3			◎			◎					
スクレアFL	11		1	3			◎		◎						
ストロビーDF	11		7	3		◎	◎		◎	◎	◎				
ファンタジスタ顆水	11		1	2		◎	◎	◎		◎					
フロンサイドSC	29		*c	1		◎	◎								
			*b	1									◎		
カスミン液	24		30	2	◎										
アグレプト水	25		90	2	◎										
マイコシールド水	41		21	4	◎										
ロブラール水	2		45	2		◎				◎					
フジワン粒	6		60	1									◎		
インダーFL	3		1	2			◎			◎					
オーシャイン水	3		1	3		◎	◎	◎		◎					
オーシャインFL	3		1	3			◎	◎		◎					
オンリーワンFL	3		1	3			◎	◎		◎					
スコア顆水	3		1	3			◎			◎					
トリフミン水	3		14	3			◎								
マネージDF	3		45	3			◎								
バリダシン液5	U18		7	4	◎										

ウ

メ

ウメ (果樹類、落葉果樹、小粒核果類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	かいよび病	灰色かび病	黒星病	灰星病	環紋葉枯病	すす斑病	うどんこ病	縮葉病	白紋羽病	枝枯病	ゆめ進
バッチレート塗	M1		*e	3											◎
チオノックFL	M3		21	2			◎								
トレノックスFL	M3		21	2			◎								
ペンコゼブFL	M3		21	3	◎		◎			◎					
ベルコートFL	M7		30	3		◎	◎			◎					
ベルコート水	M7		30	3		◎	◎	◎	◎	◎				◎	
デランFL	M9	劇	14	2			◎			◎					
アタッキン水	1・25		90	2	◎		◎								
ゲッター水	1・10		21	3		◎	◎								
オルフィンプラスFL	7・3		1	3			◎	◎							
ナリアWDG	7・11		7	2		◎	◎	◎	◎	◎	◎				
ナティーボFL	11・3		1	2		◎	◎			◎					
スイッチ顆水	9・12		45	2		◎	◎								
アグリマイシン-100水	25・41		90	2	◎										
ポリベリン水	19・M7		30	3		◎	◎			◎					

*a: 葉芽発芽前まで *b: 収穫後～開花前まで(但し収穫60日前まで)

*c: 発芽期まで(但し収穫60日前まで) *d: 発芽前

*e: 剪定時及び病患部削り取り直後

*f: 硬核期まで *g: 発病前～発病初期

ウ

メ

ウメ(果樹類、落葉果樹、小粒核果類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使用 回数	ア ブ ラ ム シ 類	カ イ ガ ラ ム シ 類	モ モ ヒ メ ヨ コ バ イ 類	カ メ ム シ 類	ハ マ キ ム シ 類	シ ン ク イ ム シ 類	ノ コ メ ト ガ リ キ リ ガ 類	ケ ム シ 類	ス カ シ バ 類	コ ス カ シ バ 類	ケ シ キ ス イ 類	キ ク イ ム シ 類	カ ミ キ リ ム シ 類	ハ ダ ニ 類	
除虫菊剤 3	3A		7	5	◎														
スプレーオイル	UNM	*a	-		◎														
トモノールS	UNM	*a	-		◎														
バイオセーフ	-	*d	-																ク
オリオン水40	1A	劇	7	3	◎					◎	◎								ク
ガットキラール	1B	*b	2											◎		◎			
スミチオン乳	1B	14	2		◎				◎			メ							ク
マラソン乳	1B		7	5	◎	◎			◎										
アグロスリン水	3A	劇	7	3	◎														
アディオソール	3A		1	2	◎														
スカウトFL	3A	劇	1	3	◎			◎											
テルスターFL	3A	劇	1	2				◎											
フォース粒	3A	劇	3	1															ア
マブリックEW	3A	劇	21	2	◎							オ							
マブリック水20	3A	劇	21	2	◎		◎					◎							
ロディー水	3A	劇	7	3	◎		◎				◎	◎							
ロビンフッドエアゾル	3A		1	5									◎	◎					◎
アクタラ顆粒	4A		7	2	◎			◎											ク
アドマイヤー顆水	4A	劇	*g	2	◎														
ダントツ溶	4A		1	3	◎			◎				◎				◎			ク
バリアード顆水	4A	劇	1	2	◎					◎						ア			
モスピラン顆粒	4A	劇	1	3	◎	◎					◎					◎			ク
トランスフォームFL	4C		3	3	◎	◎													
ディアナWDG	5		1	2					◎			◎							
デリゲートWDG	5		1	2					◎			◎							
チェス顆水	9B		21	2	◎														
ニッソラン水	10A		7	2															◎
アブロードFL	16		7	2		幼													
マトリックFL	18		3	3									モ						
カネマイトFL	20B		7	1															◎
ダニトロンFL	21A		7	1															◎
アクセルFL	22B		1	3								◎				◎			ク
サムコルFL10	28		14	3					◎	◎	◎		◎						
フェニックスFL	28		1	2								◎				◎			
		*c	1												◎				
キックオフ顆水	4A・28		14	3				◎				◎							

*a:発芽前 *b:休眠期(落葉後～萌芽期) *c:開花期まで *d:幼虫発生期
 *e:成虫発生期(但し収穫7日前まで) *f:成虫発生期(但し収穫14日前まで)
 *g:収穫21日前まで(但し露地栽培については発芽期から開花期を除く)
 ア:アカマダラケシキスイ オ:オビカレハ(別名ウメケムシ) ク:クビアカツヤカミキリ
 メ:アメリカシロヒトリ モ:モンクロシヤチホコ 幼:幼虫

ウ
メ

ウメ(果樹類、落葉果樹、小粒核果類の登録農薬も使用できる)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
かいよう病		1. 病枝は切り取り処分する。 2. 防風林、防風垣を設ける。	開花期から5月下旬までは多発しやすい。風雨直後の防除を重点的に行う。 ●耐性菌を生じやすいので連用しない。 △希釈倍数等使用方法を誤ると、葉の退緑斑、果皮の退緑化等被害を生じるので注意。
	開花期以降 ～5月下旬	・次の薬剤のいずれかを散布する。 アグリマイシン-100(水)● 1000倍 アタッキン水和剤● 800～1000倍 Zボルドー(水) 500倍 マイコシールド(水)●△ 1500倍	
灰色かび病		・地上に落下した発病果は集めて処分する。	●耐性菌を生じやすいので連用しない。
	2月下旬 ～3月下旬	・次の薬剤のいずれかを散布する。 ゲッター水和剤● 1000～1500倍 ポリベリン水和剤 1000倍 ロブラール水和剤● 1000～1500倍	
黒星病	発芽前	・病枝は切り取り処分する。	春先から温暖で雨の多い年に発生しやすい。 小向、豊後、白加賀、玉英などはかかりやすく、小梅品種、梅郷、南高などは比較的にかかりにくい。 ●耐性菌を生じやすいので連用しない。 *小粒核果類での登録
	4～5月	・次の薬剤のいずれかを散布する。 オーソサイド水和剤80* 800～1000倍 スコア顆粒水和剤● 2000～3000倍 ストロビードライフロアブル● 2000～3000倍 ゲッター水和剤● 1000倍 ベルコート水和剤 2000倍 ポリベリン水和剤 1000倍 マネージDF● 4000倍	
環紋葉枯病	生育期	・次の薬剤のいずれかを散布する。 ストロビードライフロアブル 2000倍 トップジンM水和剤* 1000～1500倍 ベルコート水和剤 2000倍 ロブラール水和剤 1000～1500倍	多雨年に多発する。 *小粒核果類での登録
すす斑病	4月上旬 ～5月上旬	・次の薬剤のいずれかを散布する。 ストロビードライフロアブル 2000～3000倍 ベルコート水和剤 2000倍	

ウ

メ

ウメ(果樹類、落葉果樹、小粒核果類の登録農薬も使用できる)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
アブラムシ類	4月上旬 ～5月中旬 (落花直後の散布が効果的である)	・次の薬剤のいずれかを散布する。 アディオン乳剤 3000倍 アドマイヤー顆粒水和剤*a 10000倍 ウララDF* 2000～4000倍 オリオン水和剤40 1000倍 スミチオン乳剤 1000～2000倍 ダイアジノン水和剤34* 1000～1500倍 バリアード顆粒水和剤 2000～4000倍 モスピラン顆粒水溶剤 2000～6000倍	モモアカアブラムシ、スモモオマルアブラムシは葉を縮れさせる。 オカボノアブラムシは新梢に、モモコフキアブラムシは葉裏に寄生してすす病を誘発する。 *a:露地栽培については発芽期から開花期を除く *小粒核果類での登録
カイガラムシ類	12月(休眠期) 5月中旬～6月中旬 ・9月上旬	・次の薬剤を散布する。 スプレーオイル#1 30～50倍 ・幼虫発生期に次の薬剤のいずれかを散布する。 マラソン乳剤 1000～2000倍 アプロードフロアブル#2 1000倍 トランスフォームフロアブル 1000～2000倍	#1スプレーオイルは芽の活動する以前(12月)に散布する。 #2幼虫での登録 タマカタカイガラムシは越冬幼虫を削り取るか、5月中下旬に発生する若齢時に薬剤防除する。
モモヒメヨコバイ	7～9月	・次の薬剤を散布する。 テッパン液剤* 2000倍 マブリック水和剤20 4000倍 ロディー水和剤 2000倍	*小粒核果類での登録
オビカレハ (ウメケムシ)	1月(剪定時) 4月上旬(幼虫初期) 5月上旬(分散期)	1.卵は小枝に指輪状にうみつげられるので剪定の時に除く。 2.分散前の幼虫を巣ごと処分する。 ・次の薬剤を散布する。 マブリックEW 4000倍	薬剤防除は幼虫の群生している初期に行う。
アメリカシロヒトリ		1.若齢幼虫期には、巣網をつくって集団でいるので枝ごと処分する。 2.幼虫発生期に次の薬剤のいずれかを散布する。 スミチオン乳剤 1000倍 ダイアジノン水和剤34* 1000～1500倍	幼虫は5月下旬～6月下旬と8月中旬～9月中旬の年2回発生する。 幼虫が巣網を離れる前に防除する。低木の根元などで蛹になる。 *小粒核果類での登録
ハダニ類		・次の薬剤を散布する。 カネマイトフロアブル 1000倍	
その他の病害虫		ウメスカシクロバ	

ウ
メ