

# ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	白さ(又はワツカ症)病	べと病	白斑病	炭疽病	亀裂(リゾクトニア菌)変症	根こぶ病	黒斑細菌病	軟腐病
サンボルドー水		M1		-	-		◎						
Zボルドー水	△	M1		-	-	白							
マスタピース水		-		1	-							◎	◎
スターナ水		31		14	5								◎
ハチハチ乳		39	劇	30	1	◎							
バシタック水75	×	7		21	3					◎			
アミスター20FL		11		14	3	◎							
メジャーFL	×	11		3	3	◎							
ライメイFL		21		7	4	◎							
ランマンFL		21		3	3	◎							
フロンサイドSC		29		*a	1				◎				
フロンサイド粉		29		*a	1				◎				
マイコシールド水		41		14	3								◎
リゾレックス粉	×	14		*a	1					◎			
ネビジン粉	×	36		*a	1						◎		
ピシロックFL	×	U17		1	2	◎							
バリダシン粉DL		U18		7	4					◎			
ヨネボン水		M1		7	4	白						◎	◎
ダコニール1000FL		M5		45	3	◎		◎	◎				
ユニフォーム粒	△	4・11		*a	1	白							
カセット水		31・24		14	3							◎	◎
マテリーナ水		31・25		30	2								◎
ナレート水		31・M1		21	3								◎
アミスターオブティFL		11・M5		45	3	白							
カスミンバリダシン液		24・U18		14	3								◎
カスミンボルドー水	△	24・M1		14	3	ワ						◎	◎
キンセット水	△	M1・M1		21	3								◎

\*1:ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

\*a:播種前 白:白さび病のみの登録 ワ:ワツカ症のみの登録

※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の薬害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。

ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	タ ネ グ リ バ エ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	ナ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ブ ラ ハ バ チ 類	ア オ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ 類	タ マ ナ ギ ン ウ ワ バ 類	ネ キ リ ダ ラ ノ メ イ ガ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ	そ の 他 害 虫	
																						×
スピノエース顆水		5		7	3						◎◎						◎					
エコマスターBT		11A		*i	-											◎						
エスマルクDF		11A		*i	-											◎						
フローバックDF		11A		*i	-											◎						
パイデートL粒	×	1A	劇	*c	1	◎													◎◎			
ラグビーMC粒	×	1B		*c	1												◎		◎◎			
オルトラン粒	×	1B		*c	1	◎					◎◎											
カルホス粉	×	1B		*a	1		◎									◎						
サイアノックス乳		1B		14	2	◎					◎◎	若		◎			成					
ジェイエース粒	×	1B		*c	1	◎					◎◎											
ダイアジノン粒5		1B		*a	1		◎									◎		◎			ケ	
				*f	2																	
				*g	1																	
ネキリエースK粒	×	1B		*d	1											◎						
ネマキック粒		1B		*c	1														◎			
ネマトリンエース粒	×	1B		*c	1														◎◎			
マラソン乳		1B		14	6	◎		ハ		◎	◎											
アグロスリン水		3A	劇	7	5	◎				◎	◎◎											
アディオソ乳		3A		30	4	◎				◎	◎◎					◎				サ		
ガードベイトA粒		3A		*b	4											◎						
サイハロン水		3A	劇	21	3	◎				◎	◎◎											
トレボン乳		3A		21	3	◎				◎	◎◎											
トレボンMC		3A		21	3	◎					◎											
フォース粒	×	3A	劇	*a	1		◎										◎					
				14	1													◎				
マブリック水20		3A	劇	14	2	◎				◎	◎◎	◎◎										
アドマイヤーFL		4A	劇	14	2	◎																
アドマイヤー1粒	×	4A		*a	1	◎																
アクタラ顆溶	×	4A		7	2	◎																
アクタラ粒5	×	4A		*a	1	◎																
アルバリン顆溶	×	4A		7	2	◎											◎			サ		
スタークル顆溶	×	4A		7	2	◎											◎					
アルバリン粒	×	4A		*a	1	◎											◎					
				*h	1	◎												◎				
ダントツ溶		4A		7	2	◎														サ		
ダントツ粒		4A		*a	1	◎																
モスピラン顆溶		4A	劇	14	1	◎				◎	◎◎						◎			サ		
モスピラン粒		4A		*a	1	◎					◎											

ダイコン

ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	タ ネ バ エ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	ナ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ブ ラ ハ バ チ 類	ア オ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ バ 類	タ マ ナ ギ ン ウ ワ バ 類	ネ キ リ ム シ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ 虫	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 虫	そ の 他 害 虫
トランスフォームFL	×	4C		1	3	◎																
ディアナSC	×	5		1	2		◎			◎	◎	◎	◎		ウ		◎	◎				
アニキ乳		6		3	3					◎	◎	◎	◎				◎					
アフーム乳		6		7	3						◎	◎					◎					
コテツFL	△	13	劇	14	2						◎	◎										サ
パダンSG溶	△	14	劇	7	3	◎	◎			◎	◎	◎						◎				サ
リーフガード顆水		14	劇	14	2	◎				◎	◎	◎					◎	◎				
アタブロン乳	△	15		14	3						◎	◎	◎	◎			◎					
カスケード乳		15		14	3						◎	◎					◎					
ノーモルト乳		15		21	2						◎	◎	◎									
マッチ乳		15		14	3						◎	◎										
ファルコンFL		18		3	3							◎	◎									
マトリックFL		18		7	3								◎				◎					
ハチハチ乳		21A	劇	30	1	◎		◎		◎	◎	◎					◎	◎				サ
トルネードエースDF	×	22A		21	2					◎	◎	◎	◎	◎			◎					サ
アクセルFL		22B		7	2					◎			◎				◎	◎				
アクセルバイト粒		22B		7	2											◎						
フェニックス顆水		28		7	2							◎					◎					
プリロン粒	×	28	*a	1	◎					◎	◎	◎				◎	◎	◎				
プレバソンFL 5	×	28		1	3		◎			◎	◎	◎	◎				◎					
ベネビアOD	×	28		1	3	◎	◎			◎	◎	◎	◎				◎	◎				サ
ヨーバルFL	×	28		1	3						◎	◎					◎	◎				
ウララDF	×	29		1	2	◎																
グレーシア乳		30		7	2						◎	◎	◎				◎	◎				
プロフレアSC		30		1	3					◎	◎	◎	◎				◎	◎				サ
ファインセーブFL		34	劇	14	2							◎										
プレオFL		UN		14	2						◎	◎	◎	◎								
ビーラム粒	×	-	*c	1																◎	◎	
アベイル粒	×	4A・28		*a	1	◎					◎	◎					◎	◎				
アフームエクセラ顆水		6・15		14	3						◎	◎					◎					

ダイコン

## ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

\*1: ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

\*a: 播種時 \*b: 播種時～生育初期 \*c: 播種前 \*d: 播種時または定植時  
\*f: 播種時及び生育期(但し収穫21日前まで) \*g: 生育期(但し収穫21日前まで)  
\*h: 生育期(但し収穫30日前まで) \*i: 発生初期(但し収穫前日まで)

ウ: ウワバ類 ケ: ケラ

サ: ダイコンサルハムシ (ダイコンハムシ)

ハ: ハモグリバエ

若: 若～中齢幼虫 成: 成虫

※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の薬害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。