

コンニャク(野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	葉 枯 病	白 絹 病	根 腐 病	腐 敗 病	乾 腐 病	ア ブ ラ ム シ 類	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ
I Cボルドー66DFL	M1		-	-	◎			◎			
Zボルドー水	M1		-	-	◎			◎			
クプロシールドFL	M1		-	-	◎			◎			
コサイド3000DF	M1		-	-	◎						
ジーファイン水	NC・M1		1	-	◎						
スターナ水	31		*a 14	1 5				◎ ◎			
トップジンM粉DL	1		*a	1					◎		
ベンレート水	1		*a	1					◎		
バシタック粉	7		*j	4		◎					
ランマンFL	21		14	3			◎				
リゾレックス水	14		30	3		◎					
トリフミン水	3		*a	1					◎		
キノンドー水40	M1		30	8	◎			◎			
ヨネポン乳	M1		30	7	◎			◎			
ユニフォーム粒	4・11		*g	1			◎				
			*e	1		◎	◎				
			30	1			◎				
アタッキン水	1・25		*a	1				◎	◎		
			*i	1				◎	◎		
ドーマイシン水	25・M1		30	6	◎			◎			
アグリマイシンー100 水	25・41		*a	-				◎			
			30	6	◎			◎			
ナレート水	31・M1		21	5				◎			
スミチオン乳	1B		14	3						◎	
ネマトリンエース粒	1B		*c	1							◎
アクタラ粒5	4A		*L	1						◎	
アドマイヤー顆水	4A	劇	21	2						◎	
アドマイヤー1粒	4A		*d	2						◎	
			*h	1						◎	
モスピラン粒	4A		*k	1						ワ	
コルト顆水	9B		1	3						◎	
ウララDF	29		7	2						◎	

*a:植付前 *d:生育期(但し収穫21日前まで) *c:植付前 *e:培土時

*g:植付時 *h:培土時(基根伸長期) *i:貯蔵前又は植付前

*j:植付時および生育期(但し収穫30日前まで) *k:培土時(出芽期)

*L:培土時(但し出芽前まで)

ワ:ワタアブラムシ

コンニャク（野菜類、イモ類の登録農薬も使用できる）

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
根腐病	植付時	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無病種いもを植付ける。 2. 圃場の排水を良好にする。 3. 土壌消毒する。（土壌消毒の項参照） 4. 次の薬剤を植溝土壌混和する。 ユニフォーム粒剤 9 kg/10a 	
	生育期	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次の薬剤を株元灌注する。 ランマンフロアブル 500～1000倍液 3 l/m² 	
腐敗病・ 葉枯病	植付前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 無病種いもを植え付ける。 	高温多湿時において 茎葉に傷害を受けた場合 に多発となるので、 台風通過後は薬剤を散布 する。 ストマイ剤は高温多 照、乾燥時に散布する と薬害がしやすい。
	6月下旬 ～9月上旬	<ol style="list-style-type: none"> 1. 病株はすみやかに除去する。 2. 発生の初期に次の薬剤のいづれ かを散布する。 アグリマイシン-100(水) 1000倍 キノンドー水和剤40 500～600倍 ゾーマイシン水和剤 500倍 Zボルドー(水) 500～800倍 	
乾腐病	植付前	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無病種いもを植付ける。 2. 次の薬剤のいづれかを処理する。 トップジンM粉剤DL 種いも重量の2～3%粉衣 トリフミン水和剤 50倍 種いもの芽基部に散布 ベンレート水和剤 50～100倍 種いもの芽基部に散布 	未熟有機物の多い圃 場やアルカリ土壌で発 生しやすい。
白絹病	植付時	<ol style="list-style-type: none"> 1. 発病畑は消毒する（土壌消毒の項 参照）。 2. 無病種いもを植付ける。 	7～8月の盛夏に発生 が多い。
	培土時	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次の薬剤を株元散布する。 ユニフォーム粒剤 9 kg/10a 	
	生育期	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次の薬剤を株元灌注する。 リゾレックス水和剤 1000倍液 3 l/m² 	
アブラムシ 類	培土時 生育期	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次の薬剤のいづれかを散布する。 アドマイヤー1粒剤 培土時(株元土壌混和) 3～6kg/10a 生育期(茎葉散布) 6 kg/10a スミチオン乳剤 1000倍 	
ネコブセン チュウ	収穫時	<ul style="list-style-type: none"> ・ 種いもは、センチュウの寄生し ていないものを選ぶ。 	
	植付前 定植前	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壌消毒をする（土壌消毒の項 参照）。 2. 次の薬剤を全面に施用して土壌 混和する。 ネマトリンエース粒剤 25kg/10a 	