

トウガラシ類\*1 (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	疫病	うどんこ病	斑点病	灰色かび病	黒枯病	炭疽病	菌核病	苗木枯病	斑点細菌病
トリフミン水	3		1	5		◎							
ラリー水	3		1	4		◎	◎						
カンタスDF	7		1	2			◎	◎					
スクレアFL	11		1	3					◎	◎			
ストロビーFL	11		1	2		シ							
ライメイFL	21		1	3	◎								
ランマンFL	21		1	4	◎								
ロブラール水	2		3	2			シ						
オリゼメート粒	P2		*a	1		◎	◎						
サンヨール乳	M1		1	4		甘							
オーソサイド水80	M4		*b	2								◎	
シグナムWDG	7・11		1	2		◎	◎	◎	◎				
ユニフォーム粒	4・11		1	1	シ								
カスミンボルドー水	24・M1		1	5		◎	◎						◎

\*1: トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P. 70)を参照のこと。

\*a: 定植時 \*b: 播種後～2～3葉期まで

シ: シントウを除く

甘: 甘長トウガラシのみに適用

トウガラシ類\*1 (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ミ ナ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ 類	ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ 類	タ バ コ ガ 類	オ オ タ バ コ ガ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ 類	ネ キ リ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類	ケ ネ ム シ 類	チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ 類	ハ ダ ニ 類	
スピノエース顆水	5		1	2			甘	甘	甘									
コロマイト乳	6		1	1		甘												
アドバンテージ粒	1A	劇	*c *a	1				◎										
オンコル粒5	1A		*d	1				◎										
ダイアジノン粒5	1B		*f *b	3 2									◎		◎			
アディオン乳	3A		7	2	◎					タ								
アーデント水	3A		1	2	◎				◎									◎
アクタラ顆溶	4A		1	3	シ													
アクタラ粒5	4A		*a	1	◎													
アドマイヤー顆水	4A	劇	*j	2	◎		◎	◎	◎									
アドマイヤー1粒	4A		*a *c	1	◎		◎	◎	◎									
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		1	2	◎	◎	◎	◎	◎									
アルバリン粒 スタークル粒	4A		*e *a *g *h	1	◎ ◎ ◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎									
ダントツ溶	4A		1	3	◎	◎		◎										
バリアード顆水	4A	劇	1	3	◎													
ベストガード溶	4A		1	3		◎												
ベストガード粒	4A		*a	1	シ			シ										
モスピラン顆溶	4A	劇	1	2	シ													
ディアナSC	5		1	2			◎											
アニキ乳	6		1	3		◎				◎	◎							◎
アフーム乳	6		7	2						◎								
コルト顆水	9B		1	2 3	ア 甘	ア 甘												
チェス顆水	9B		1	3	◎													
コテツFL	13	劇	1	2				シ	シ		シ							シ
カスケード乳	15		1	3				甘										
マッチ乳	15		1	4							◎							
ダニトロンFL	21A		1	1														◎
モベントFL	23		*i	1	灌	灌	灌	灌	灌								灌	灌
フェニックス顆水	28		1	2				◎			◎							◎

トウガラシ類

## トウガラシ類\*1 (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ類	タバコガ	オオタバコガ	ハスモンヨトウ類	ネキリムシ類	コガネムシ類	ケラ	チャノホコリダニ類	ハダニ類	
プレバゾンFL5	28		*i	1		灌						灌						
プレオFL	UN		1	2			◎	○	○	◎	○							
サンヨール乳	-		1	4	甘													
アプロードエースFL	16・21A		1	2		◎												

\*1:トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.70)を参照のこと。

\*a:定植時

\*b:播種時又は定植時

\*c:育苗後半

\*d:育苗後半または定植時

\*e:育苗期

\*f:収穫開始14日前まで

\*g:定植時(但し収穫30日前まで)

\*h:生育期(但し収穫開始14日前まで)

\*i:育苗後半～定植当日

\*j:収穫前日まで(但し露地栽培については開花期終了後から)

ア:甘長トウガラシを除く

シ:シントウを除く

甘:甘長トウガラシのみに適用

葉:トウガラシ(葉)のみに適用

タ:タバコガ

灌:灌注処理での登録

※トウガラシ(葉)は農薬取締法上は野菜類に分類される。葉を食用として収穫する場合、野菜類又はトウガラシ(葉)に登録がある農薬しか使用できない。

トウガラシ(葉)の登録における「使用時期(日数)」は、葉を収穫する前までの日数なので注意する。