

サクラ*1(樹木類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	てんぐ巣病	幼果菌核病	ゆ合促進	アブラムシ類	カイガラムシ類	ケムシ類	アメリカシロヒトリ	モンクロシヤチホコ	コスカシバ	クビアカツヤカミキリ
サンリット水	3		*g	3		◎								
トップジンM水	1		*j	5										
トップジンMペースト	1		*f	5	◎									
バッチレート塗	M1		*e	-			◎							
チューリサイド水	11A		*a	-						◎	◎			
チューンアップ顆水	11A		*a	-					◎	◎	◎			
トアローFLCT	11A		*a	-						◎	◎			
バシレックス水	11A		*a	-						◎	◎			
スプレーオイル	UNM		*i	-					◎					
バイオリサ・カミキリ	-		*l	-										確
バイオセーフ	-		*h	-									◎	確
スカシバコンL	-		*d	-									◎	
オリオン水40	1A	劇	*a *b	5						◎	◎	◎		◎
リラークDF	1A	劇	*a	5							◎			
オルトラン水	1B		*a	5							◎	◎		
カルホス乳	1B		*a *L	6					◎	◎	◎	◎		◎
ジェイエース溶	1B		*a	5							◎	◎		
スミチオン乳	1B		*L	6										◎
スミバイン乳	1B		*b	6									◎	
ダイアジノンSLゾル	1B		*a	4							◎			
園芸用キンチョールE	3A		-	-										確
ロビンフッドエアゾル	3A		-	6										◎
マブリック水20	3A	劇	*a	2							◎			
アトラック液	4A		*c	3							樹			樹
ウッドスター液	4A		*n	3										樹
マツグリーン液2	4A		*m *a *L	1 5					◎	◎	◎	◎		確 確
モスピラン顆溶	4A	劇	*a	5										◎
リバイブ液	6		*o	1						樹	樹	樹		確
ノーモルト乳	15		-	2							◎			
トルネードエースDF	22A		*a *L	4						◎	◎	◎		◎
ファイントリムDF	22A		L *a	4						◎				◎
アクセルFL	22B		*a *p	6						◎	◎	◎		確
ダブルトリガー液	28		*a *r	2										◎
ロックオン水	28		*a	2						◎	◎	◎		

*1:本表は、非食用のサクラの農薬登録を示している。

葉の食用を目的とする場合は、農薬取締法上、野菜類に分類されるので、野菜類の登録農薬が使用できるが、本表記載の剤、及び樹木類の登録農薬は使用できない。

*a:発生初期 *b:成虫発生期 *c:幼虫発生前～幼虫発生期 *d:成虫発生初期～終期

*e:剪定時及び病患部削り取り直後 *f:病枝切除後 *g:展葉始期～展葉期 *h:幼虫発生期

*i:発芽前 *j:発病初期 *L:成虫発生初期 *m:春季～秋季 *n:新葉展開後～落葉期まで

*o:発生前～発生期 *p:使用時期を確認すること *r:発生前～発生初期

樹:樹幹注入 確:薬剤ごとの使用方法を確認すること