

病虫害発生予察情報

2 月月報

平成 13 年 3 月 12 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

2 月	気		温		降 水 量		日照時間	
	最 高	最 低	平 均		(mm)		(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)
上旬	8.6	-0.6	0.2	1.0	4.2	0.1	13	107
中旬	9.3	-0.5	-0.7	-0.9	4.2	-0.7	0	0
下旬	14.0	4.2	1.5	1.0	7.7	2.6	6	32
平均	10.4	0.8	0.2	0.3	5.2	0.5		
合計							19	34
							156.1	90

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：平年値(1979-2000年の平均値)からの差(比)

気 温：上旬は平年並、中旬は低く、下旬は高かった。

降 水 量：上旬は多く、中・下旬は少なかった。

日照時間：上旬は少なく、中・下旬は平年並であった。

< 天候概況 >

上旬：高気圧に覆われて、晴れた日もあったが、日本の南岸を低気圧が通過して雨や雪など、ぐずついた天気となった。

中旬：旬に前半には前線や気圧の谷の影響で曇りや雨、又は雪などぐずついた天気となり気温は低く経過した。後半には移動性高気圧に覆われ、晴れて気温の上がった日もあった。

下旬：移動性高気圧に覆われ、概ね晴れた。特に 22 日は快晴となって気温が上がり、大手町では最高気温が 19.7 まで上がった。なお、関東地方では 28 日に南よりの強風が吹き春一番となった。

2 作物生育概況

(1) 野 菜

果菜類：ナス等の苗の生育はほぼ順調であった。また、加温の施設トマトにおいてもほぼ順調の生育を示した。

葉菜類：施設のコマツナ、ホウレンソウは低温の影響により、やや生育が遅れる傾向にあった。

3 病害虫の発生概況

(1) 野菜の病害虫

トマト（施設）

灰色かび病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
葉かび病	< 並 >	発生は平年並であった。
オンシツコナジラミ	< 少 >	発生は少なかった。
マメハモグリバエ	< 少 >	発生は少なかった。
トマトサビダニ	< 少 >	発生はやや少なかった。

トマト・ナス（育苗）

アブラムシ類	< 少 >	発生はやや少なかった。
オンシツコナジラミ	< 少 >	発生はやや少なかった。

イチゴ（施設）

灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
うどんこ病	< 並・一部やや多 >	全般的には発生は平年並であったが、区部の施設でやや多い発生が認められた。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。

コマツナ（施設）

コナガ	< 少 >	発生は少なかった。
ナモグリバエ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ヤサイゾウムシ	< 並 >	発生は平年並であった。

ハウレンソウ（施設・トンネル）

べと病	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
ケナガコナダニ	< 少 >	発生は少なかった。

タマネギ

タネバエ	< 少 >	発生は少なかった。
------	-------	-----------

(2) 花きの病害虫（施設）

花卉共通

灰色かび病	< やや少 >	平年よりやや少なかったが、1 月以前と比較して発生は増加傾向にあった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。

(3) 島しょの病害虫

特記事項なし

病害虫の発生予察情報、発生状況などをお知らせしています

テレホンサービス

042 (525) 8236

インターネットホームページ

<http://www.taes.metro.tokyo.jp/boujo>

