

病虫害発生予察情報

5 月月報

平成13年6月8日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

2001 年 5 月	気 温						降 水 量 (mm)		日 照 時 間 (h)	
	最 高		最 低		平 均					
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
上旬	19.3	-2.4	12.5	0.3	15.6	-1.3	57	178	29.6	62
中旬	24.6	2.5	14.9	1.8	19.7	2.2	26	53	91.4	205
下旬	23.8	0.1	17.3	2.8	20.2	1.2	106	294	19.0	39
平均	22.6	0.1	14.9	1.6	18.5	0.7				
合計							189	161	140.0	102

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：準平年値(1979～2000年の平均値)からの差(比)

気 温：上旬は平年より低く、中・下旬は平年より高くなった。

降 水 量：上旬は平年に比べ多く、中旬は少なく、下旬はかなり多かった。

日照時間：上旬は平年より少なく、中旬はかなり多く、下旬はかなり少なかった。

< 天候概況 >

上旬：4 月下旬に引き続き気温は低い状態が続き、低気圧の南岸通過の影響を受け、雨や曇りの日が多かった。旬降水量は平年より多くなった。

中旬：不安定な大気の日や、低気圧の通過もあったが、高気圧に覆われる日が多く、晴れて暑くなった。そのため旬降水量は平年に比べかなり少なくなった。

下旬：南岸を通過する低気圧の影響で雨の日が続いた。29 日は大気が不安定となり、雷雨があり多摩東部の一部で雹があった。

2 作物生育概況

(1) イ ネ

育苗箱、苗代ともに生育は平年並であった。

(2) サツマイモ

苗の活着は良好であった。

(3) 野 菜 類

果 菜 類：施設および露地栽培のトマト、キュウリ等の生育はほぼ順調であった。4 月に霜害をうけたスイ - トコ - ンは生育の不揃いや遅れがみられ、エダマメでは生育の減退や草姿の乱れがみられた。なお、5 月 29 日に一部の地域で雹が降り、町田市の一部でナス、キュウリ、レタスなどで被害がみられた。

葉根菜類：施設、露地のコマツナ、ホウレンソウやキャベツなど葉菜類の生育はほぼ順調であった。またダイコン、カブなどの根菜類やサトイモ、ジャガイモなどイモ類の生育も概ね

順調であった。

(4) 果 樹

ウ メ：小、大梅の収穫期は平年より7～10日早く、果実肥大、揃いの程度は平年よりややよかった。

ナ シ：着果の程度は平年より多かった。

ブドウ：開花期は昨年より7日程度早く、平年より6日程度早かった。

カ キ：開花期は昨年より5日前後早く、平年より7～10日早かった。

ク リ：開花期は昨年より10～12日早く、平年より2週間程度早かった。

(5) 茶 樹

収穫開始は平年並であったが、4月の寡雨と晩霜の影響を受け、収量が減少した。

3 病虫害の発生概況

(1) イネの病虫害

ばか苗病 < 少 > 育苗箱での発生は少なかった。

ヒメトビウンカ < 少 > 発生は少なかった。

(2) 果樹の病虫害

ナ シ

赤星病 < やや少 > 発生はやや少なかった。

黒星病 < やや少 > 発生はやや少なかった。

アブラムシ類 < やや多 > 発生はやや多かった。

カメムシ類 < 多 > 発生は多かった。

ハマキムシ類 < 少 > 発生は少なかった。

ウ メ

アブラムシ類 < やや多 > 発生はやや多かった。

カ キ

カキクダアザミウマ < やや少 > 発生はやや少なかった。

キウイフル-ツ

キウイヒメヨコバイ < やや多 > 発生はやや多かった。

(3) 茶樹の病虫害

ハマキムシ類 < やや少 > 発生はやや少なかった。

カンザワハダニ < やや多 > 発生はやや多かった。

(4) 野菜の病虫害

キュウリ

うどんこ病 < 並 > 発生は平年並であった。

べと病 < やや多 > 発生はやや多かった。

アブラムシ類 < やや多 > 発生はやや多かった。

アザミウマ類 < 少 > 発生は少なかった。

ウリハムシ < やや多 > 発生はやや多かった。

トマト(施設)

灰色かび病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
葉かび病	< 並 >	発生は平年並であった。
白ぶくれ症	< 少 >	発生は少なかった。
タバココナジラミ	< 少 >	発生は少なかった。
オンシツコナジラミ	< 一部やや多 >	全般的に発生は平年並であったが、一部地域で発生はやや多かった。
アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。

ナス

アザミウマ類	< 並 >	発生は平年並であった。
ハダニ類	< 並 >	発生は平年並であった。
アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。

ニジュウヤホシテントウ

< 一部やや多 > 全般的に発生は平年並であったが、山間部で発生が多い圃場があった。

イチゴ

灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
-------	-------	-----------

キャベツ

菌核病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< 並 >	発生は平年並であった。
ヨトウガ	< 並 >	発生は平年並であった。
モンシロチョウ	< 並 >	発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや多 >	発生はやや多かった。

コマツナ

白さび病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< 並 >	発生は平年並であった。
ナモグリバエ	< やや多 >	発生はやや多かった。
カブラハバチ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
アザミウマ類	< 少 >	発生は少なかった。

ホウレンソウ

アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。
アカザモグリハナバエ	< 少 >	発生は少なかった。

ネギ

さび病	< 少 >	発生は少なかった。
ネギアブラムシ	< やや多 >	発生はやや多かった。
ネギアザミウマ	< やや多 >	発生はやや多かった。
ネギハモグリバエ	< 並 >	発生は平年並であった。

ジャガイモ

疫病	< 少 >	発生は少なかった。
----	-------	-----------

ニジュウヤホシテントウ

< 一部やや多 > 全般的には平年並であったが、山間地域で発生はやや多かった。

野菜共通の病虫害

マメハモグリバエ	< 並 >	発生は平年並であった。
ナモグリバエ	< やや多 >	発生はやや多かった。

タネバエ	< 少 >	発生は少なかった。
ネキリムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや多 >	発生はやや多かった。

(5)花きの病害虫

キ ク

アブラムシ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
キクスイカミキリ	< やや多 >	発生はやや多かった。
アザミウマ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。

花き共通の病害虫

灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
ミカンキイロアザミウマ	< 並 >	発生は平年並であった。

(6)植木の病害虫

ツバキ・サザンカ

チャドクガ	< 並 >	発生は平年並であった。
-------	-------	-------------

ツツジ

ツツジゲンバイムシ	< やや多 >	発生はやや多かった。
-----------	---------	------------

(7)島しょの病害虫

利島

ハスオビエダシャク	< やや多 >	発生はやや多かった。
-----------	---------	------------

八丈島

トビモンオオエダシャク	< 少 >	発生は少なかった。
-------------	-------	-----------

テレフォンサービス

042(525)8407

インターネットの防除所ホームページ
<http://www.taes.metro.tokyo.jp/boujo>

病害虫の発生予察情報，発生状況，防除方法
などをお知らせしています。

