

病虫害発生予察情報

2月月報

平成 14 年 3 月 11 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

2002 年 2 月	気 温						降 水 量 (mm)		日 照 時 間 (h)	
	最 高		最 低		平 均					
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
上旬	10.5	1.3	1.7	2.5	5.8	1.7	22	180	44.8	72
中旬	10.3	0.5	-1.0	-1.2	4.9	0.0	0	0	79.2	132
下旬	13.5	3.7	5.0	4.5	9.1	4.0	2	11	38.5	76
平均	11.3	1.7	1.7	1.8	6.4	1.7				
合計							24	43	162.5	94

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：準平年値(1979～2000年の平均値)からの差(比)

気 温：上・下旬は平年より高く，中旬は平年並であった。

降 水 量：上旬は平年より多く，中・下旬は少なかった。

日照時間：月を通じて平年並であった。

<天候概況>

上旬：高気圧と低気圧が交互に通過し，短い周期で天気は変わった。旬の終わりに強い寒気のため雪が降った。

中旬：冬型の気圧配置が多く，晴れた日が多くなった。

下旬：低気圧の通過で僅かの降雨が3日ほどあったが，概ね高気圧に覆われ，晴れた日が多かった。

2 作物生育概況

(1)野 菜 類

果菜類：ナス等の育苗は概ね順調である。加温の施設トマトも順調な生育を示している。

根菜類：施設及びトンネルのコマツナ，ホウレンソウは概ね順調な生育を示している。プロッコリーでは花蕾や葉に低温の影響がみられる地域もあるが，概ね順調である。

3 病害虫の発生概況

(1)野菜の病害虫

トマト(施設・抑制)

灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
葉かび病	< 並 >	発生は平年並であった。
オンシツコナジラミ	< 並 >	全般的には発生は平年並であったが、あきる野市の一部で発生が多かった。

マメハモグリバエ

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

トマト・ナス(育苗)

オンシツコナジラミ

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

コマツナ(施設)

コナガ

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

ナモグリバエ

< やや少 >	発生はやや少なかった。
---------	-------------

ヤサイゾウムシ

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

ホウレンソウ(施設・トンネル)

べと病

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

ケナガコナダニ

< やや少 >	発生はやや少なかった。
---------	-------------

アブラムシ類

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

イチゴ(施設)

灰色かび病

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

うどんこ病

< 並 >	全般的には発生は平年並であったが、区部の一部施設でやや多い発生が認められた。
-------	--

ハダニ類

< 並 >	全般的には発生は平年並であったが、練馬区の一部で発生がやや多かった。
-------	------------------------------------

(2)花きの病害虫(施設)

花卉共通

灰色かび病

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

アブラムシ類

< 少 >	発生は少なかった。
-------	-----------

(3)島しょの病害虫

特記事項なし

テレフォンサービス

042(525)8407

インターネットの防除所ホームページ

<http://www.jppn.ne.jp/tokyo>

病害虫の発生予察情報，発生状況，防除方法
などをお知らせしています。