

病虫害発生予察情報

10月月報

平成9年11月16日

東京都病虫害防除所

1 気象概況

9月	気 温						降 水 量		日 照 時 間	
	最 高		最 低		平 均		(mm)		(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	年比(%)
上旬	22.7	0.3	11.2	-2.8	16.3	-1.5	18.5	34.4	63.4	105.7
中旬	22.4	1.7	8.8	-3.3	14.9	-1.1	0.0	0.0	75.2	118.2
下旬	21.7	2.5	8.4	-0.6	14.4	0.7	0.0	0.0	85.1	115.3
平均	22.2	1.5	9.5	-2.1	15.2	-0.6				
合計							18.5	12.8	223.7	113.3

1) 観測地：東京都農業試験場秋川庁舎（あきる野市引田）

2) 平年値：1973年～1990年の平均値

3) 平年比：平年値を100とした値

◎気 温：月を通じて平年に比べ、最高気温は高めに、最低気温は低めに推移し、月平均気温は平年より低かった。

◎降 水 量：上旬に降雨があったものの、中、下旬は雨がなく、月を通じてかなり少なかった。

◎日 照 時 間：月を通じてやや多めに推移した。

<天候概況>

上旬は北に偏った高気圧や気圧の谷の影響等により曇りの日が多かった。平均気温は平年よりやや低く、降水量もやや少なかった。

中旬はおおむね晴れたが、最低気温が低く推移した。平均気温は平年よりやや低く、降水量はかなり少なかった。

下旬は移動性高気圧に覆われたため、晴れの日が多く、平均気温は平年よりやや高かった。降水量は中旬に引きつづき、かなり少なかった。

2 作物生育概況

(1) 大豆・落花生 : 生育は順調であった。

(2) 野菜類

葉菜類 ホウレンソウ、コマツナの生育はやや早まった。

キャベツの生育はやや遅れた。

根菜類 生育はやや早まった。

3 病虫害の発生概況

(1) イネの病虫害

セジロウンカ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
イネツトムシ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
トビイロウンカ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
コブノメイガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

(2) 果樹の病虫害

カキ

カメムシ	< 少 >	各地とも発生はなかった。
------	-------	--------------

(3) 野菜の病虫害

トマト

オンシツコナジラミ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ハスモンヨトウ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
マメハモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
トマトサビダニ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ナス

うどんこ病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ハダニ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
フキノメイガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ミナミキイロアザミウマ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ミカンキイロアザミウマ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
チャノホコリダニ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

キュウリ (施設)

うどんこ病	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
べと病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ハクサイ・ダイコン

モザイク病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
べと病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

ハスモンヨトウ	<やや多～多>	各地とも発生はやや多～多であった。
ハイマダラノメイガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
キャベツ・カリフラワー・ブロッコリー		
黒腐病	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
軟腐病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
黒斑細菌病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ヨトウムシ類	<やや多>	各地とも発生はやや多かった。
コナガ	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
コマツナ		
白さび病	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
炭そ病	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
コナガ	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
ダイコン		
軟腐病	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
アブラナ科野菜		
キスジノミハムシ	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
アブラムシ類	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
ネ ギ		
さび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
黒斑病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ネギハモグリバエ	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
ネギアザミウマ	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
ヨトウムシ類	<やや多>	各地とも発生はやや多かった。
ハウレンソウ		
べと病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
シロオビノメイガ	<やや多>	各地とも発生はやや多かった。
ワタアブラムシ	<やや多>	各地とも発生はやや多かった。
野菜共通		
マメハモグリバエ	<やや少>	各地とも発生はやや少なかった。
ヤサイゾウムシ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
オオタバコガ	<やや多～多>	各地ともハクサイ、トマト、ピーマン、インゲン、キャベツ等で発生はやや多～多であった。

(4) 花・植木などの病虫害

植木類

コガネムシ類	<やや多>	各地とも発生はやや多かった。
チャドクガ	< 多 >	各地とも発生は多かった。

花き類

コナダニ・ハダニ	< 並 >	各地とも各種花きで発生は平年並であった。
----------	-------	----------------------

タバコガ類

＜やや多＞ 各地のパンジー、キンギョソウ、シクラメン
などで発生がやや多かった。