

病虫害発生予察情報

9 月 月 報

平成 9 年 1 0 月 1 6 日

東京都病虫害防除所

1 気象概況

9 月	気 温						降 水 量		日 照 時 間	
	最 高		最 低		平 均		(mm)		(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	年比(%)
上旬	29.3	1.0	20.6	0.7	24.4	0.8	39.5	52.3	56.3	81.2
中旬	24.4	-1.2	17.5	-0.9	20.6	-1.0	109.0	131.0	33.0	57.3
下旬	21.8	-1.3	14.0	-2.2	17.3	-1.9	57.0	74.9	40.3	74.6
平均	25.2	-0.5	17.4	-0.8	20.7	-0.8				
合計							205.5	87.5	129.6	71.6

1) 観測地：東京都農業試験場秋川庁舎（あきる野市引田）

2) 平年値：1973 年～1990 年の平均値

3) 平年比：平年値を 100 とした値

気 温：上旬はやや高く、中・下旬はやや低かった。

降 水 量：中旬は台風などの影響でやや多かったが、月合計の降水量は平年に比べ、やや少なかった。

日 照 時 間：全般に曇りや雨の日が多く、日照時間は少なかった。

< 天候概況 >

上旬は前線の影響で曇りや雨の日が多かった。平均気温は平年よりやや高めであった。

中旬は台風や秋雨前線の影響で曇りや雨の日が多く、平均気温もやや低かった。

下旬は低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多く、平均気温はかなり低かった。

2 作物生育概況

(1) イ ネ ： 莖数、草丈は平年並。倒伏もなく、登熟は順調に進んだ。

(2) 野 菜 類

果 菜 類 生育は順調であった。

葉 菜 類 キャベツ、ブロッコリーは9月中旬以降の長雨、日照不足によりやや生育に遅延が認められた。ホウレンソウ・コマツナは9月上旬播きの生育は順調であったが、9月中旬以降播きでは、長雨、日照不足により1～2週間の生育遅延が認められた。

根 菜 類 ダイコン、ニンジン は 平年～やや遅延。

イ モ 類 サツマイモ、サトイモの生育は順調であった。

(3) 果 樹

特記事項なし

3 病害虫の発生概況

(1) イネの病害虫

いもち病	< 局所やや多 >	一部地域で穂いもちがやや多かった他は各地とも発生は少なかった。
紋枯病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
セジロウンカ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ニカメイガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
イネツトムシ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
トビイロウンカ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
コブノメイガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

(2) 果樹の病害虫

ナ シ

黒星病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
アブラムシ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ニセナシサビダニ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ナシヒメシンクイ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

リンゴ

チャバネアオカメムシ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
クサギカメムシ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

果樹共通

アオマツムシ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
--------	---------	-----------------

(3) 茶樹の病害虫

炭そ病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
チャハマキ・		
コカクモンハマキ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

(4) 野菜の病害虫

トマト

オンシツコナジラミ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

トマトサビダニ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ナス

うどんこ病 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

アブラムシ類 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

ミナミキイロアザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ミカンキイロアザミウマ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

チャノホコリダニ < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

フキノメイガ < 局所多 > 羽村市の一部で枝の芯折れを引き起こした。

キュウリ（施設）

うどんこ病 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

ネギ

さび病 < 少 > 各地とも発生は少なかった。

黒斑病 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

ネギハモグリバエ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ネギアザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ヨトウムシ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

キャベツ

黒腐病・黒斑細菌病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

コナガ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

コマツナ

炭そ病 < 少 > 各地とも発生は少なかった。

コナガ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

カブラヤガ < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

ヒラズハナアザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ネギアザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

マメハモグリバエ < 局所やや多 > 国立市、府中市などの一部で発生がやや多かった。

アブラナ科野菜

キスジノミハムシ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ヨトウムシ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

ハイマダラノメイガ < 多 > 各地とも各種アブラナ科野菜で発生が多かった。

ニンジン

黒葉枯病 < 少 > 各地とも発生は少なかった。

うどんこ病 < 多 > 各地とも発生は多かった。

ハウレンソウ

- べと病 < 少 > 各地とも発生は少なかった。
 アザミウマ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。
 シロオビノメイガ < 並 > 各地とも発生は平年並みであった。

サツマイモ

- ナカジロシタバ < 多 > 各地とも発生は多かった。
 ピーマン
 タバコガ < 多 > 各地とも発生は多かった。

野菜共通

- ハスモンヨトウ < 局所多 > 青梅市、羽村市および日野市の一部で多発したほか、各地で発生はやや多かった。
 マメハモグリバエ < 並～やや多 > 各地とも発生は平年並～やや多かった。
 ワタアブラムシ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。
 ハダニ類 < 並 > 各地とも各種作物で発生は平年並であった。
 オオタバコガ < 多 > 各地のトマト、ナス、インゲン、キャベツなどで発生が多かった。
 コガネムシ類 < 多 > ナス、コマツナ、インゲンの食葉害のほか、サクラソウの保存花壇（北区）で被害が大きかった。

(5) 花・植木などの病害虫

庭木および街路樹

- ハダニ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。
 チャドクガ < 多 > 各地とも発生は多かった。
 アメリカシロヒトリ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

植木類

- コガネムシ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。
 花き類
 オオタバコガ < 多 > ミニガーベラなどで発生が多かった。

(6) 島しょの病害虫

ブバルジア・トルコギキョウ ; 大島でハスモンヨトウの発生はやや多かった。

テレフォンサービス
 042(525)8407

病害虫の発生予報、発生状況、防除方法をお知らせしています。