

病虫害発生予察情報

9月月報

平成10年10月27日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

9月	気 温						降 水 量		日 照 時 間	
	最 高		最 低		平 均		(mm)		(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
上旬	26.7	-1.7	20.6	-0.6	23.3	-1.1	24	45	26.2	58
中旬	28.8	3.3	20.7	1.6	24.6	2.6	176	278	40.9	130
下旬	25.5	2.4	21.1	4.1	22.9	3.1	100	109	11.3	36
平均 合計	27.0	1.3	20.8	1.7	23.6	1.5	300	154	78.4	73

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：平年値(1979～1990年の平均値)からの差(比)

- ◎ 気 温：上旬はやや低く、中・下旬はやや高かった。
- ◎ 降 水 量：中・下旬は台風などの影響で多かった。
- ◎ 日照時間：上旬と下旬は前線や台風の影響で曇りや雨の日が多く、日照時間は少なかった。

<天候概況>

上旬は前線などの影響で曇りや雨の日が多かった。平均気温は平年よりやや低めであった。

中旬は台風5号の影響で降水量はかなり多く、平均気温はやや高かった。

下旬は台風7・8号と前線の影響で雨の日が多かった。平均気温はかなり高かった。

2 作物生育概況

(1) イ ネ

日照不足のため徒長気味であった。台風のためコシヒカリは倒伏。

(2) サツマイモ

塊根の肥大は、前年に比べて遅れた。

(3) 野 菜 類

果 菜 類：ナスは台風により果実にスレなどの傷みが生じ、若干品質の低下がみられた。

葉 茎 菜類：キャベツ、ブロッコリーは生育がやや遅れ、黒腐病の発生が多かった。

葉 菜 類：ホウレンソウは長雨により立枯症状が多発した。

根 菜 類：ダイコンは生育が遅れ、軟腐病の発生が多かった。

(4) 果 樹

ナ シ：豊水、新星などの中生品種の収穫時期は、平年に比べ 10～14 日早かった。果実肥大

大は平年並みからやや良であった。ウドンコ病による落葉が品種によって多く

見ら

れた。

ブドウ：中生大粒品種の収穫時期は、平年に比べ 10～14 日早かった。

ク リ：各品種の収穫時期は、平年に比べ 10～14 日早かった。裂果の発生が、平年より多

く見られた品種があった。

カ キ：果実肥大は平年より良好であった。早生品種の着色開始は、平年より 10 日前後早

かった。台風による葉の折損が一部で見られた。

3 病虫害の発生概況

(1) イネの病虫害

いもち病（穂いもち） <やや多> 各地とも発生はやや多く、山間の一部地域では多発し

た。

紋枯病	< 多 >	各地とも発生は多かった。
セジロウンカ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ニカメイガ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
イネツトムシ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
トビイロウンカ	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
コブノメイガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

(2) 果樹の病虫害

ナ シ

黒星病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ニセナシサビダニ	< 少 >	各地とも発生少なかった。
ナシヒメシンクイ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

リンゴ

チャバネアオカメムシ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
クサギカメムシ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

果樹共通

アオマツムシ < 少 > 各地とも発生少なかった。

(3) 茶樹の病虫害

炭そ病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

チャハマキ・

コカクモンハマキ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

(4) 野菜の病虫害

トマト

オンシツコナジラミ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

トマトサビダニ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

ナ ス

うどんこ病 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

アブラムシ類 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ミナミキイロアザミウマ

< 少 > 各地とも発生は少なかった。

ミカンキイロアザミウマ

< やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

チャノホコリダニ < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

フキノメイガ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

ピーマン

タバコガ < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

キュウリ（施設）

うどんこ病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ネ ギ

さび病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

黒斑病 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

ネギハモグリバエ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ネギアザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ヨトウムシ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

キャベツ

黒腐病・黒斑細菌病 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

コナガ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

コマツナ

炭そ病 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

コナガ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ヒラズハナアザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ネギアザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

マメハモグリバエ < 局所やや多 > 国立市、府中市などの一部で発生がやや多かった。

アブラナ科野菜

キスジノミハムシ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ヨトウムシ類 < やや多 > 各地とも発生はやや多かった。

ハイマダラノメイガ < 少 > 各地とも発生は少なかった。

発生	ダイコン		
	軟腐病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
	ニンジン		
	黒葉枯病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
	うどんこ病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
	ハウレンソウ		
	べと病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
	アザミウマ類	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
	シロオビノメイガ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
	サツマイモ		
	ナカジロシタバ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
	野菜共通		
	ハスモンヨトウ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	マメハモグリバエ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
	ワタアブラムシ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	ハダニ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	オオタバコガ	< やや少 >	各地のトマト、ナス、インゲン、キャベツなどで
			はやや少なかった。
	コガネムシ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	ネキリムシ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
(5) 花き類・植木の病虫害			
	シクラメン		
	灰色かび病	< 局所やや多 >	一部施設で発生がやや多かった。
	花き類		
	オオタバコガ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	庭木および街路樹		
	ハダニ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	チャドクガ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	アメリカシロヒトリ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	植木類		
	コガネムシ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
	(6) 島しょの病虫害		
	ブバルジア・トルコギキョウ		大島でハスモンヨトウの発生がやや多かった。

テレフオンサービス
042(525)8407

病害虫の発生予報、発生状況、
防除方法をお知らせしています。