

使用者の皆さまへ

家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン®粒剂 (農林水産省登録第 19568 号)  
の登録内容変更についてのお知らせ

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農業の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剂は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農業残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

● 農業登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剂の使用をしないようお願いします。

作物名
ミニトマト
はつかだいこん

● 使用方法の変更作物について

今後、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剂は、表①のとおり農業登録変更内容においてご使用願います。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表① 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剂 (変更部分のみ抜粋)】

作物名	通用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7ヶ月を含む農業の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3~6g/m <sup>2</sup> (1株当り1~2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後は1回以内)
	アブラムシ類	6g/m <sup>2</sup>	育苗期	1回	散布	
はくさい	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3~6g/m <sup>2</sup> (1株当り1~2g)	定植時	1回	植穴処理	1回
トマト	アブラムシ類 オンコノゾミ				植溝散布 又は 植穴処理	
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミマテ類 オンコノゾミ	1株当り2g	株元散布			
ピーマン	アブラムシ類	6g/m <sup>2</sup> (1株当り2g)	株元散布			
ブロッコリー	ヨウムシ	3~4g/m <sup>2</sup>	は種前	1回	植溝散布	
だいこん	アオムシ、コガ アブラムシ類	4g/m <sup>2</sup>	収穫21日前まで	1回	株元散布	1回
かぶ	アブラムシ類	3~6g/m <sup>2</sup> (1株当り1~2g)	植付時	1回	植溝散布	3回以内 (植付時の処理 は1回以内、 植付後は2回以内)
ばれいしょ						

裏面もご覧ください。

使用者の皆さまへ

## 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン® 水和剤 (農林水産省登録第 19566 号) の登録内容変更についてのお願い

平成 26 年 11 月 17 日付で、以下の登録内容が変更となりました。

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。

このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

### ●農薬登録の削除作物について

下記作物への適用が削除されました。家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤の使用をしないようお願いします。

作物名			
かんきつ	ミニトマト	トマト	なす
ブロッコリー	はつかだいこん	だいこん	

その他、「とうもろこし」が「未成熟とうもろこし」に変更されました。

### ●使用方法の変更作物について

今後、家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤は、表②のとおり農薬登録変更内容においてご使用願います。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

【表② 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤 (変更部分のみ)】

作物名	適用害虫名	希釈倍率(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	ヨウムシ、ハスモンヨウ、 タナキンウバ	1000~1500	100~300 ml/m <sup>2</sup>	収穫30日 前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの 処理は 1回以内、 定植後は1 回以内)		
	アオムシ、コナガ、 アブラムシ類	1000~2000							
はくさい	アブラハバチ、 ヨウムシ、 ハスモンヨウ	1500			1500~2000		3回以内	1回	
	アオムシ、コナガ、 アブラムシ類	1500~2000							
レタス	ヨウムシ	1000~1500			1000		3回以内	3回以内	
	材タバコガ	1000							
ばれいしょ	テトウムシ、マシ幼虫、 ヨウムシ	1000			1000~1500		2回以内	3回以内 (植付時の 処理は1回 以内、植付 後は2回 以内)	
	アブラムシ類、 ジャガイモガ	1000~1500							
オクラ	アブラムシ類、 ミドリコバエ	1000			1000		収穫開始 7日前まで	1回	1回
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	1000			1000		収穫7日 前まで	2回以内	2回以内
ぶどう	チャカイロアザミウマ、 フタテンヒメコバエ	1500~2000	200~700 ml/m <sup>2</sup>	収穫60日 前まで	1回	1回			
	ハマキムシ類	1500							
かき	カキクダアザミウマ、 チャカイロアザミウマ、 カキハタムシガ	1500	1500	収穫45日 前まで	2回以内	2回以内			

裏面もご覧ください。