

生産者の皆さまへ

平成26年11月17日付で
登録内容が変わりました。

ホクコー
オルトラン® 粒 剤
水和剤



【粒剤：農林水産省登録第13177号】【水和剤：農林水産省登録第13175号】

日本では、農業の安全性を一層担保するために、今年から短期暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、ホクコーオルトラン粒剤・水和剤は自主的に登録縮小の申請をし、登録されました。これは、新たに登録された使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く1日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、生産者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録内容にてご使用いただきますようお願いいたします。

◆ 農業登録の削除作物について

下記、登録削除作物ではホクコーオルトラン剤を使用しないようお願いします。

ホクコーオルトラン粒剤	作物名	登録削除の内容
	ミニトマト	作物を削除
	はつかだいこん	

ホクコーオルトラン水和剤	作物名	登録削除の内容
	かんきつ	作物を削除
	トマト	
	ミニトマト	
	ブロッコリー	
	なす	
	だいこん	
	かぶ	
	はつかだいこん	

その他、「たかな」が非結球あぶらな科葉菜類から作物削除、「とうもろこし」が「未成熟とうもろこし」に変更されました。

◆ 使用方法の変更作物について

今後、ホクコーオルトラン剤は表①および表②のとおりの変更された登録内容においてご使用願います。使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

表① ホクコーオルトラン粒剤

□ : 登録縮小に該当する作物
赤字 : 変更部分

裏面もご覧ください。

平成26年11月17日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の登録回数	使用方法	アザラシを含む病害の検出回数
キャベツ	アオムシ、コナヨウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時	1回	補穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1回	散布	
トマト	アブラムシ類 オンコウジナガ	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時	1回	作業散布 又は 補穴処理	1回
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミマダ オンコウジナガ				株元散布	
ピーマン	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	補穴処理	1回
はくさい	アオムシ、コナヨウムシ アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	定植時	1回	株元散布	
ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (2g/株)	定植時	1回	株元散布	1回
だいこん	アオムシ、コナヨウムシ類	3~4kg/10a	は種前	1回	作業散布	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫21日前まで	1回	株元散布	1回
ごぼう	アブラムシ類	3~6kg/10a	収穫75日前まで	1回	株元散布	2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)
れんこん		4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布 無人刈り取りによる散布	2回以内
ばれいしょ	アブラムシ類	3~6kg/10a (1~2g/株)	補付時	1回	作業散布	3回以内 (補付時の処理は1回以内、 補付後は2回以内)
えだまめ	ハスモンゾウ	3~6kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	生育期株元散布	3回以内
なばな	アブラムシ類	6kg/10a	定植時	1回	補溝土壌混和	1回
			は種時		播溝土壌混和	
花き類・ 観葉植物	アザミマダ類 アブラムシ類	3~6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
	ヨウムシ類					
宿根スターチス	コナメシ類幼虫	6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内
カーネーション	コナメシ					
アリウム	ネギコ					
さく	ネキリムシ類 ハマグリハムシ類	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用 土壌約1.5~4L) 当り50g	定植時	1回	本剤の所定量を セル成型育苗 トレイまたは ペーパーポットの 上から均一に 散布する。 株元散布	1回
たであい	アブラムシ類					
いぐさ	イグサシシムシ	4kg/10a	生育期	2回以内	灌水散布	2回以内
芝	シバキリトウ シバキ	10kg/10a	発生初期	5回以内	全面散布	5回以内
	アマナキ	5~10kg/10a				
たばこ	ヨウムシ、ネキリムシ アブラムシ類	3~6kg/10a	移植前	1回	作業散布後 土壌混和	2回以内
	アザミマダ類 ジャガイモガ ヤブイグサ アブラムシ類		本畑初期		株元散布	



北興化学工業株式会社

☎03-3279-5161

http://www.hokkochem.co.jp/

表② ホクコーオルトラン水和剤 : 登録簿小に該当する作物 ■ : 変更部分

平成26年11月17日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍率(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の併用回数
キャベツ	ヨウムシ、ハスモンゾウヤナギンクワバ	1000~1500	100~300 L/10a	収穫90日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000~2000					
はくさい	カラハバチ、ヨウムシ、ハスモンゾウ	1500	100~300 L/10a	収穫90日前まで	1回	散布	1回
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1500~2000					
レタス	ヨウムシ	1000~1500	100~300 L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
	オオカバコガ	1000					
非結球レタス	ヨウムシ	1000~1500	100~300 L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
カリフラワー	ヨウムシ	1000	100~300 L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、みずな、ルッコラ、たかなを除く)	アブラムシ類	1500	100~300 L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回
しょうが	アブラムシ類	1500	100~300 L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
ごぼう	アブラムシ類	1500	100~300 L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)
オクラ	アブラムシ類、シロヨコバイ、テトウムシ、アブラムシ類	1000	100~300 L/10a	収穫開始7日前まで	1回	散布	1回
ばれいしょ	ヨウムシ	300	25L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	3回以内 (播付時の処理は1回以内、播付後は2回以内)
	アブラムシ類	1000~1500	100~300 L/10a				
	アブラムシ類、シロヨコバイ	1000~1500	100~300 L/10a				
てんさい	ヨウムシ	1000~1500	100~300 L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、散布は3回以内)
	テンサイモグリハナバエ	1000	100~300 L/10a				
	ヒバムシ類	1000	100~300 L/10a				
	ヨウムシ	16	1.8L/10a				
ヒバムシ類	60~100	2.5~3L/10a	育苗期	1回	灌注		
赤皮類 とうもろこし	アブラムシ類	1000	100~300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
あずき	アブラムシ類、ヨウムシ	1000	100~300 L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
だいず	ハスモンゾウ、マシクイガ、アブラムシ類	16	1.8L/10a	収穫60日前まで			
えだまめ	ハスモンゾウ、アブラムシ類	1000	100~300 L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
いんげんまめ	アブラムシ類	1000	100~300 L/10a	収穫14日前まで			
たまねぎ	ネギアザミマ	1000~1500	25L/10a	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内 (無人ヘリコプターによる散布)
		300					
		16					
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000	100~300 L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
ぶどう	チャノキアザミマ、フジヤシロコバエ	1500~2000	200~700 L/10a	収穫80日前まで	1回	散布	1回
	ハマキムシ類	1500					

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

作物名	適用病害虫名	希釈倍率(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の併用回数
かき	カキアザミマ、チャノキアザミマ、ネキハムシ、アシコカガラムシ	1500	200~700 L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
いちじく	アザミマ類	2000	200~700 L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
茶	チャノキアザミマ、チャノキアザミマ	1000~2000	200~400 L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
	チャノキアザミマ	1000~1500					
さんしょう(果実)	チャノキアザミマ	1500	200~700 L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
たいおろ	ヨウムシ	1000	100~300 L/10a	生育期併し、収穫230日前まで	3回以内	散布	3回以内
みしまさいこ、薬用にしん、ソルガム	アブラムシ類	1500		収穫30日前まで	5回以内		
やまのいも	ヤマノイモカシラカ、イモカシラカ	1000	100~300 L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
薬しようが	アブラムシ類	1500		収穫21日前まで	3回以内		
たばこ	ヨウムシ、タバコアザミマ、アブラムシ類	1500~2500	25~180 L/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ヤシロコバエ	1000~2000	1L/㎡	苗床期			
	シロコバエ若齢幼虫、シロコバエ中齢幼虫	1500~2000	25~180 L/10a	収穫10日前まで			
つつじ類	ツツジコバエ	1500	200~700 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
つばき類	ツバキコバエ	1500					
さくら	モンシロチョウ	1000~1500	100~300 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
花き類・観葉植物	アザミマ類、アブラムシ類	1000~1500					
きく	アオムシ、ヨウムシ類	1000~1500	100~300 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ストック	マハモグリハエ、オオカバコガ	1000~1500					
宿根アスター	ヨナスシハモグリハエ	1000~1500	100~300 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
オンシジウム	カガラムシ類	1000~1500					
カーネーション	コガ	1000~1500	100~300 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ひまわり	カバコガ	1000~1500					
斑入りアマドコロ	ハマキムシ類	1000	200~700 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
リアトリス	ハマキムシ類	1000					
樹木類	アザミマ類	1000	200~700 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
グラジオラス	アザミマ類	1000	200~700 L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
芝	シバコガ、タマナガ	1000	0.25~2L/㎡	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	スジネヨウ、ケラ	1000	1~2L/㎡				
	シバオサガラムシ成虫	1000	2L/㎡				
	アカアザミマ	1000	0.5~1L/㎡				
もりあざみ	アブラムシ類	1500	100~300 L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
まめ科牧草	アブラムシ類	1000	100~300 L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内



北興化学工業株式会社

☎03-3279-5161

http://www.hokkochem.co.jp/

13175P01002